

見えないコート層が  
見えない敵を  
シャットアウト!

ウイルス不活性化コート剤

# RISK OFF

リスクオフ



優位性

アルコールと抗ウイルス剤のダブル効果で接触感染リスクを極減。

成分

シリコン、特殊倍効4級アンモニウム塩、エタノールベースのアルコール

課題を解決

- ① 3大感染源(飛沫感染、空気感染、接触感染)から接触感染を減らすこと。
- ② 誰でも、いつでも、どこでも使えて、アルコール消毒作業の手間を省くこと。
- ③ 蒸発すると効果がなくなるアルコール消毒作業の合い間をカバー。
- ④ いつ触れてもウイルスが不活性化しているように即効性があること。
- ⑤ コート層の表面の抗ウイルス性の強さと持続性があること。

特長

- ・ 使い方は簡単。手が触れるようなエリアに、直接スプレーするか、布などに染み込ませて、液浮きがなくなるまで塗り広げて拭き上げるだけ。
- ・ 20分ほどで乾燥し、抗菌・抗ウイルスコート層が形成すると準備完了。
- ・ コート層の表面に付いたウイルスを10分程度で99%以上不活性化。
- ・ コートしておけば、抗ウイルス効果は3ヶ月持続。重ね塗りも可能。
- ・ 10~15mlで1m<sup>2</sup>が使用量の目安。1本で約20m<sup>2</sup>もコートでき経済的。
- ・ コート層が剥がれたかどうか確認するための指示薬を用意しております。
- ・ 広い面積をコートされる場合は、大きな容量の業務用を用意しております。



## 三滅の方程式で接触感染からリスクオフ

1

リスクオフを塗布すると、  
**そこにいるウイルスをアルコールで瞬滅!**

2

抗ウイルスコート層ができると、  
**次々に襲ってくるウイルスを速攻撃滅!**

3

抗ウイルスコート層に接触すると、  
**表面に接するウイルスを継続鬼滅!**



## 接触感染リスク極減効果のある用途例



## 不活性化コートすると効果がある場所



取扱上のご注意

○液浮きがあると乾燥に相当な時間を要しますので、よく拭き上げて下さい。○塗り重ね、塗り直し可能です。コート層が剥がれると効果がなくなりますので再コートして下さい。○再コートのタイミングは、手などの接触頻度の多い少ない、家庭なのか商業施設、介護・医療機関なのかによってもそれぞれ異なりますので、3ヶ月に1回~1日1回の間を目安として任意に決めて下さい。○スマホなど透明で特に背景が染色の場合、曇りが生じますので、曇りが消えるまでよく拭き上げて下さい。○手指消毒用ではありません。本革、マスク、眼鏡、皮膚、生物、長く皮膚と接触する物、食品、食器、調理具、人体に接する医療器具などへは使用できません。○衣服など染み込む材質はシミのような濡れた感じになる場合がありますのでご注意下さい。○接触感染しないことや、ウイルスが100%死滅することを保証するものではありません。○その他の注意点などについては、よくある質問でHPに記載しております。

消 防 法	引火性危険物
	第4類アルコール類
消費期限	開封後3ヶ月
容 量	200mlスプレー

発 売 元

アクロス工業合同会社 (Across Kogyo LLC.)

〒104-0043 東京都中央区湊1-12-10

TEL:03-6914-0104 FAX:03-6914-0050 www.across224.com

Made in JAPAN